MAREK SANAK

*Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Skawińska 8, 31-066 Kraków
E-mail: marek.sanak@uj.edu.pl*

GENETYKA PANDEMII COVID-19

HISTORIA PANDEMII COVID-19

Stan pandemii COVID-19, choroby spowodowanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, trwa już prawie dwa lata. Powoduje to poważne skutki społeczne i gospodarcze w skali całego świata, porównywalne do globalnych konfliktów zbrojnych.

Historycznego podobieństwa obecnej sytuacji epidemicznej można się doszukać w pandemii wywołanej wirusem grypy A1H1 (hiszpanki) w latach 1918-1920. Chorowało wtedy około 500 milionów ludzi, czyli 1/3 ówczesnej populacji. Grypa hiszpanka spowodowała śmierć od 17 do 50 milionów ludzi. W latach 1890-1892 inny koronawirus spowodował również pandemię nazywaną wtedy rosyjską gripą (VIJGEN i współaut. 2005). Przechorowało około 300-800 milionów ludzi, zmarło przypuszczalnie milion chorych. Ten historyczny koronawirus sprzed 130 lat nadal jest obecny w populacji człowieka. Nazywa się OC43 i z czasem się zmienił, obecnie powodując łagodne zakażenia układu oddechowego, nieodróżnialne od innych przeziębień.

Pierwsze zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u ludzi, czyli początek obecnej pandemii, stwierdzono w chińskim Wuhan pod koniec listopada 2019 r. W tej dużej aglomeracji miejskiej, stolicy prowincji Hubei, znajduje się ośrodek badań wirusologicznych – Wuhan Institute of Virology. Zbieżność miejsca wybuchu pandemii z obecnością wirusologicznego ośrodka badawczego spowodowa-

ła spekulacje dotyczące pochodzenia wirusa SARS-CoV-2. Analiza jego sekwencji nukleotydowej, a dokładniej częstości wykorzystania kodonów poszczególnych aminokwasów, przeczy spiskowej teorii wyprodukowania SARS-CoV-2 w warunkach laboratoryjnych (HUSSAIN i współaut. 2021). Są jednak inne niepotwierdzone doniesienia o pobieraniu przez pracowników Instytutu z Wuhan próbek z populacji dzikich nietoperzy do badań naukowych. Przypadkowe zakażenie pracownika byłoby bardziej prawdopodobną okolicznością pojawienia się „pacjenta zero”, niż podejrzenia dotyczące handlu żywymi zwierzętami na targu w Wuhan. Do rozprzestrzenienia wirusa SARS-CoV-2 przyczyniły się podróże lotnicze. Ogniska zakażenia wybuchały również na statkach morskich, luksusowych wycieczkowcach czy okrętach wojсковych, ale tam można było sytuację łatwo zlokalizować. Główną przeszkodą w ograniczeniu rozprzestrzeniania się pandemii spowodowanej COVID-19 (nazwę choroby zaproponowała Światowa Organizacja Zdrowia; ang. coronavirus disease-2019) był dość częsty (około 20%) bezobjawowy lub łagodny przebieg zakażenia, który przypominał przeziębienie. Dodatkowo, potwierdzono zakażanie innych osób już w okresie wylegania choroby, co najmniej dobie przed pojawieniem się objawów. W celu ograniczenia tempa rozprzestrzeniania choroby wprowadzono ograniczenia w skali niespotykanej w ostatnich dekadach. Było to podyktowane obawami dotyczącymi ograniczonych zasobów

psów i kotów wirusem SARS-CoV-2, jednak przebieg takiego zakażenia jest bezobjawowy (KORATH i współaut. 2021).

CECHY EPIDEMICZNEGO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSOWEGO

Wirus może spowodować zapalenie płuc - akronim SARS oznacza zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Chory z ciężkim przebiegiem COVID-19 nie może samodzielnie podtrzymać wymiany gazowej w płucach, polegającej na wchłanianiu tlenu do krwiobiegu i wydychaniu dwutlenku węgla. Szanse na wyzdrowienie daje wspomaganie czynności oddechowych przez podawanie tlenu lub, w najcięższych przypadkach, wentylacja mechaniczna z użyciem respiratora. U dużego odsetka (40-70%) tych chorych dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia płuc, niewydolności krążenia, nerek i śmierci. Przebiegowi COVID-19 towarzyszy zwiększone ryzyko wykrzepiania krwi w naczyniach krwionośnych, powodujące występowania zatorowości i udarów (Ho i współaut. 2021).

W ostatnich latach już dwukrotnie zdarzyły się epidemie spowodowane innymi koronawirusami, o zdecydowanie mniejszej zakaźności (Ryc. 1). Po raz pierwszy zdarzyło się to w Chinach (SARS-CoV-1, 2002). Wirus dokonał przeskoku na człowieka od wiewer palmowych, przy czym był to tzw. gatunek pośredniczący, bowiem pierwotnym źródłem były nietoperze. Po raz drugi inny koronawirus zaatakował w Arabii Saudyjskiej (MERS, 2012), gatunkiem pośredniczącym były wielbłądy. Oba te wirusy charakteryzowała duża śmiertelność z powodu zapalenia płuc u osób zakażonych. Niewydolność oddechowa spowodowana zapaleniem płuc miała charakterystyczny obraz radiologiczny płuc, śmiertelność wynosiła od 10 do 40% chorych. Jednak łączna liczba chorych na SARS i MERS nie przekroczyła 10 tysięcy. Było to spowodowane niewielkim podstawowym współczynnikiem reprodukcji tych wirusów R_0 (0,1-0,4). Z tej perspektywy można tłumaczyć zaskoczenie Światowej Organizacji Zdrowia oraz krajowych organizacji zdrowia szybkością rozprzestrzeniania i rozmiarem obecnej pandemii COVID-19. Pandemia ujawniła również brak przygotowania przemysłu farmaceutycznego do produkcji leków przyczynowo zwalczających chorobę. Podczas szczytu pandemii zabrakło łóżek i respiratorów w oddziałach intensywnej terapii w chińskich, włoskich, brazylijskich i indyjskich szpitalach. Leki, których rozwój rozpoczęto w związku z SARS-CoV-1 po 2002 r., nie zostały przebadane klinicznie ani zarejestrowane. Było to nieopłacalne ze względu

na małą populację chorych na SARS albo MERS (FORD i współaut. 2020).

OBECNY STAN EPIDEMICZNY W POLSCE

Łączna liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 w Polsce od 4.03.2020 wynosi 2 miliony 922 tysięcy (stan na 10 października 2021). Badanie laboratoryjne wykrywa zakażenie na podstawie polimerazowej reakcji łańcuchowej powielającej fragment materiału genetycznego wirusa. Jest wykonywane po wyizolowaniu RNA z wydzieliny górnych dróg oddechowych. Opracowane zostały również szybkie testy antygenowe, wykrywające w tym samym materiale obecność białek kodowanych przez RNA wirusa. Badanie słabo rozróżnia osoby zakażone i aktywnie uwalniające cząsteczki zakaźne wirusa, od osoby, która jeszcze jest nosicielem materiału genetycznego wirusa lub białkowego, lecz zakażenie już zwalczyła. Przebiecie zakażenia powoduje pojawienie się we krwi przeciwciał dających co najmniej czasową odporność na nowe zakażenie. Przesiewowe badania populacji polskiej na obecność przeciwciał we krwi sugerują, że zakażenie SARS-CoV-2 przebyło około 20% populacji, natomiast niewiele ponad 50% osób powyżej 12 roku życia ma przeciwciała nabyte po szczepieniu. Ten łączny (70%) odsetek uodpornienia populacji polskiej charakteryzuje znaczna zmienność geograficzna. Aktualnie najwięcej nowych zakażeń jest obserwowanych w regionach Polski, których mieszkańcy niechętnie się szczepili. W miejscach, w których zachorowała więcej niż co dziesiąta osoba w populacji (np. Floryda, USA), proporcja osób niezdiagnozowanych w czasie zakażenia sięga 20% i koreluje zarówno z częstością przebiegu bezobjawowego, jak i z oszacowaniem nabytej odporności pozakaźnej w Polsce. Problem z identyfikacją chorych na COVID-19 wynika z pospolitości objawów, które są wspólne dla wielu zakażeń wirusowych, podobnych do sezonowej grypy. Poza uczuciem zmęczenia i pobolewaniem mięśni, są to gorączka i suchy kaszel. Jako jeden z bardziej swoistych objawów wymieniało się utratę powonienia i uczucie braku smaku potraw, co mogło trwać około 2 tygodnie. Ze względu na zmiany genetyczne wirusa, aktualnie występujące jego warianty rzadziej dają utratę powonienia, częściej natomiast dołączają się objawy obejmujące układ pokarmowy: biegunka, ból brzucha i wymioty. Wskazaniem do hospitalizacji chorego na COVID-19 jest pojawienie się duszności; chory zgłasza brak tchu i niezdolność do podejmowania wysiłku fizycznego. Osoby bez duszności i cech zapalenia płuc w ba-

daniach RTG mogą się leczyć w domu, o ile nie mają współistniejących chorób sercowo-naczyniowych lub onkologicznych. Z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, jeśli nie jest możliwa izolacja domowa, osoby lekko chore umieszczane były w izolatoriach. Kwarantanna domowa obowiązuje wszystkich, którzy pozostawali w kontakcie z chorym, przy czym zrezygnowano z wymogu uzyskania ujemnego wyniku badania wymazu z gardła po 2 tygodniach od ostatniego kontaktu. Arbitralnie wyznacza się czas kwarantanny na 10 dni. Strategia zwalczania choroby, polegająca na izolacji osoby zakażonej jest skuteczna, jeżeli uwzględnia wszystkie osoby z kontaktu z chorym. Jest jednak zupełnie nieskuteczna, jeśli osoba zakażona nie czuje się chora i nie ma objawów choroby. Stąd zalecenia dotyczące przesłaniania nosa i ust, mycia rąk i utrzymywania dystansu w kontaktach społecznych. Jak wszystkie choroby zakaźne dróg oddechowych, COVID-19 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej zakaźne są kaszlące osoby z aktywnymi objawami zakażenia. Obecność wirusa można wykryć na powierzchni przedmiotów, ubrań i ciała, wystawionych na osiadanie aerozolu produkowanego podczas kaszlu. Jest możliwe, że zakaźność cząsteczek wirusa na przedmiotach i ubraniach przetrwa kilkadziesiąt godzin. Ze względu na lipidową otoczkę wirusa, zwykle detergenty i mydło, nie wspominając o alkoholowych roztworach odkażających, są dla wirusa zabójcze.

MECHANIZM ZAKAŻENIA I ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ

Wirus SARS-CoV-2 wnika do komórek nabłonka dróg oddechowych wykorzystując obecność na ich błonie komórkowej białka ACE2 (patrz WITKOWSKI i BRYL w tym zshycie KOSMOSU). Jest to błonowy enzym, który trawi peptydy angiotensyny II do angiotensyny 1-7, cząsteczki działającej przeciwstawnie do angiotensyny II zbudowanej z 9 aminokwasów. Białko kolca wirusa (ang. spike, S) pasuje do N-terminalnej domeny peptydazowej ACE2. Po związaniu z komórką, kształt wirusowego kolca zmienia się, wyzwalając proces połączenia się otoczki wirusa z błoną komórkową. Uczestniczą w tym własne enzymy proteolityczne komórki nabłonka oddechowego. Powstaje pęcherzyk cytoplazmatyczny, w którym rozłożona na składniki cząsteczka wirusa uwalnia swoje RNA do cytoplazmy. Cząsteczka RNA wirusa jest zbudowana z 30 tysięcy rybonukleotydów. Ma sygnał lokalizacji rybosomalnej i dzięki niemu bezpośrednio koduje białka (nic dodatnia albo sensowna). Największym genem

wirusa jest tzw. otwarta ramka odczytu lab. Gen *orf1ab* koduje większość białek potrzebnych do replikacji wirusa. W wyniku jego translacji rybosomy uwalniają długi polipeptyd, który zostaje pocięty przez zakodowany na samym jego początku enzym – proteazę wirusową podobną do papainy. Jest to enzym proteolityczny rozpoznający sekwencję cięcia aminokwas hydrofobowy-arginina lub lizyna. W ten sposób powstaje 14 białek niestrukturalnych wirusa, wśród których enzym polimeraza RNA zależna od RNA i helikaza są niezbędne dla kopiowania i namnożenia RNA wirusa (genomu). Liczba kopii genomu SARS-CoV-2 może wynosić wiele tysięcy na komórkę. Wśród innych białek niestrukturalnych są egzorybonukleaza i endorybonukleaza, odpowiedzialne za oporność wirusa na wiele leków, będących analogami nukleotydowymi stosowanymi w zakażeniach wirusami RNA. Pozostałe odcinki genomu SARS-CoV-2 kodują białka strukturalne, takie jak wspomniane już białko kolca, nukleoproteinę tworzącą kompleks z genomowym RNA w zakaźnych cząsteczkach wirusa (N), białko błonowe (M) i małe białko otoczki (E). Składanie cząsteczek zakaźnych wirusa ma miejsce w pęcherzykach cytoplazmatycznych, z których wirus może być uwalniany przez egzocytozę bez uszkodzenia komórki, albo masywnie zakażona komórka nabłonka oddechowego się rozpada, uwalniając tysiące zakaźnych cząsteczek. Wirus może zakażać również inne komórki mające na powierzchni ACE2, w tym makrofagi i komórki śródbłonka naczyń. Jednak replikacja wirusa w innych komórkach nie zachodzi lub jest słaba. Większość objawów ogólnoustrojowych jest spowodowana uwalnianiem przez zakażone komórki substancji białkowych nazywanych cytokinami prozapalnymi. Są wśród nich interleukiny, np. odpowiedzialna za wzrost ciepłoty ciała interleukina-6 oraz interleukina-8 powodująca napływ granulocytów z naczyń włosowatych do zębłu płuca. Komórki wrodzonego układu odporności człowieka, do których należą monocyty i osiadłe w tkankach makrofagi, uwalniają cytokiny prozapalne, ponieważ obecność wirusowego RNA jest rozpoznawana przez obecne w ich cytoplazmie receptory. Są to receptory wzorca patogenu, nazywane w języku angielskim toll-like receptors, np. TLR-3 i TLR-8. Po kilku dniach od zakażenia białka wirusowe, prezentowane przez komórki dendrytyczne jako obce antygeny, pobudzają limfocyty T. Limfocyty pomocnicze T powodują namnożenie limfocytów B zdolnych do produkcji swoistych przeciwciał, początkowo klasy IgM, a po upływie około 2 tygodni pojawiają się w krążeniu przeciwciała klasy IgG. Te właśnie przeciwciała silnie wiążą się z biał-

ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA CZŁOWIEKA A PRZEBIEG COVID-19

człowieka o najsilniejszym wpływie ochronnym przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19 znajdują się na chromosomie 12. Jest to klastery genów OAS, kodujących syntazę oligoadenylową. Cząsteczki składające się z 2 do 5 nukleotydów adenylowych połączonych wiązaniem fosfodiesterowym 2'-5' indukują w komórce aktywność rybonukleazy L, enzymu degradującego wirusowe RNA i hamującego jego replikację. Warianty genetyczne odcinka DNA kontrolującego ekspresję genów OAS mogą powodować niedobór syntazy oligoadenylowej, zwiększając kilkakrotnie ryzyko niewydolności oddechowej u zakażonej osoby (PAIRO-CASTINEIRA i współaut. 2021).

Ciężki przebieg zakażenia koreluje z nasileniem zapalenia płuc i niewydolności nerek, przy czym stwierdza się nadmierną produkcję przez komórki odporności wrodzonej wspomnianych cytokin prozapalnych. Śmiertelność osób z udokumentowanym zakażeniem COVID-19 jest oceniana globalnie na 0,4%, może jednak przekraczać 5% (w Polsce aktualnie 2,6%), jeśli liczyć jedynie zakażonych objawowo COVID-19 (<https://ourworldindata.org>). Istnieje silny związek między wiekiem osoby zakażonej a śmiertelnością. Dotyczy to zwłaszcza seniorów (po 60 roku życia), u których aktywność układu odporności jest mniejsza, natomiast w tej grupie wiekowej wzrasta częstość chorób

Ryc. 2. Sekwencjonowanie genomu wirusa techniką nowej generacji polega na odczycie kilku milionów fragmentów kodu genetycznego o wielkości 150 nukleotydów każdy, które się następnie układa według sekwencji wzorcowej Wuhan przy użyciu oprogramowania komputerowego. Oryginalny szczep SARS-CoV-2 powodujący pierwsze zachorowania w Europie (G) został wyizolowany od jednego pierwszych chorych w Polsce (marzec 2020 r.) i ma typową mutację D614G w genie kodującym białko S. Materiał własny.

przewlekłych. Szczególnie silnym czynnikiem ryzyka dla ciężkiego przebiegu COVID-19 jest cukrzyca i otyłość.

ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA SARS-CoV-2 W CZASIE PANDEMII

Poznano wiele szczegółów dotyczących właściwości genetycznych wirusa SARS-CoV-2. Zmienia on swoją sekwencję RNA podczas replikacji dość często z powodu niedokładności polimerazy RNA, jednak obserwowane tempo mutacji w próbkach izolowanych od chorych jest wolne. Jest tak, ponieważ większość przypadkowych mutacji nie sprzyja utrzymaniu aktywności zakaźnej wirusa albo jest wobec niej neutralna. Opiswane warianty zakaźne, różniące się wobec pierwotnego szczepu Wuhan, pojawiają się podczas transmisji wirusa do nowych regionów świata. Naturalny mechanizm mutacji zostaje wtedy wzmocniony procesem selekcji pozytywnej, prowadząc do dominacji w poszczególnych krajach i podczas różnych fal zakażeń nowymi wariantami. Początkowo w Europie dominował nieznacznie bardziej zakaźny wariant z mutacją kwasu asparaginowego na glicynie w pozycji aminokwasowej 614 białka S (D614G) (Ryc. 2).

Większość nowych wariantów SARS-CoV-2 pojawia się wskutek mutacji jego białka S. Losowe zamiany aminokwasowe w sekwencji tego białka zwiększają zakaźność wirusa przez lepsze dopasowanie kolca wirusa do cząsteczki ACE2. Po pierwszej fali zakażeń w Europie (wiosna 2020) spowodowanej wariantem D614G pojawiły się nowe mutacje. Po raz pierwszy zidentyfikowany na Wyspach Brytyjskich, a obecnie nazywany alfa wariant wywołał jesienią 2020 r. dużą liczbę zakażeń (Tabela 1). W Polsce zarejestrowano szczyt zakażeń spowodowanych wariantem alfa pod koniec marca 2021 r. Równolegle z wariantem alfa, w 2020 r. pojawił się zakaźny wariant beta, bardziej odporny na przeciwciała neutralizujące. Został zidentyfikowany po raz pierwszy w Republice Południowej Afryki, natomiast nie rozprzestrzenił się w Europie. Wariant gamma wywołał falę zakażeń w Ameryce Południowej. Obecne zachorowania są spowodowane wariantem delta, który po raz pierwszy zidentyfikowano w Indiach. W obu Amerykach stwierdza się obecnie występowania wariantu mu, rzadko spotykanego w Europie. Wprowadzenie nazw pochodzących od liter greckiego alfabetu miało uwolnić od negatywnych skojarzeń kraje, w których po raz pierwszy zidentyfi-

Tabela 1. Najważniejsze warianty wirusa powodujące najliczniejsze zachorowania na świecie.

Nazwa WHO	Nazwa Pango	Gałąź ewolucyjna GISAID	Zamiany amino-kwasów	Najwcześniej wykryta próbka	Kraj odkrycia wariantu wirusa
Alfa	B.1.1.7	GRY	L18F N501Y A570D	18 grudnia 2020	Wielka Brytania
Beta	B.1.351	GH/501Y.V2	D614G K417N E484K N501Y D614G	18 grudnia 2020	Republika Południowej Afryki
Gamma	P.1	GR/501Y.V3	A701V K417T E484K N501Y D614G	11 stycznia 2021	Brazylia
Delta	B.1.617.2	G/478K.V1	H655Y L452R T478K D614G P681R	październik 2020	Indie

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, Pango – ang. Phylogenetic assessment of named global outbreak, GISAID – Globalna Inicjatywa Wymiany Danych dotyczących Grypy, analizująca również dane wirusa SARS-CoV-2. Użyto jednoliterowych kodów aminokwasów dla sekwencji białka kolca wirusa (S).

Ryc. 3. Diagram przedstawia względne liczebności zsekwencjonowanych próbek wirusa SARS-CoV-2 klasyfikowanych na podstawie gałęzi ewolucyjnych. W sposób pośredni odzwierciedlają one liczbę zakażeń różnymi szczepami wirusa. Rysunek został wygenerowany z bazy sekwencji GISAID (www.gisaid.org) i przedstawia stan na 10 października 2021 uwzględniający sekwencje 4 milionów 227 tys. izolatów wirusa.

kowano nowe warianty wirusa. Preferowana klasyfikacja nowych szczepów zakaźnych wirusa na podstawie wyników sekwencjonowania ich genomu jest bardziej precyzyjna i opiera się na klastrach podobieństwa sekwencji. Przykładowo, wariant brytyjski to alfa, czyli B.1.1.7, natomiast najczęstszy wariant indyjski to delta, czyli B.1.617.2 (Tabela 1, Ryc. 3). Warto zaznaczyć, że izolowane od chorych próbki wirusa często się różnią innymi pojedynczymi nukleotydami sekwencji, poza genem S. Dla uznania ich za warianty obaw (ang. variant of concern), istotne jest wykazanie zwiększonej zakaźności lub oporności na przeciwciała poszczepienne lub produkowane przez ozdrowieńców. Przykładami mutacji, z zapisem jednoliterowych kodów aminokwasów, zwiększających zakaźność są: D614G i N501Y, podczas gdy zamiany aminokwasowe L452R, E484K korelują z gorszym blokowaniem wirusa przez przeciwciała neutralizujące (SHRESTA i współ-

aut. 2021). Ze względu na brak leków zaprojektowanych do hamowania namnażania wirusa SARS-CoV-2, do leczenia COVID-19 zarejestrowano pojedyncze preparaty stosowane w leczeniu chorób wirusowych. Takim lekiem jest analog nukleotydowy o nazwie remdesiwir, skracający czas zakażenia COVID-19. Lek ten został pierwotnie zarejestrowany do leczenia Eboli i jego skuteczność wobec koronawirusa jest ograniczona (ANSEMS i współaut. 2021).

KIEDY KONIEC PANDEMII?

Po wybuchu pandemii COVID-19 załamał się transport lotniczy, turystyka oraz masowa kultura i sztuka. Edukacja, praktycznie przez cały rok szkolny, odbywała się zdalnie. Następstwa wirtualnego nauczania uczniów i studentów poznamy dopiero za jakiś czas. Już teraz można natomiast oszacować finansowe skutki ograniczenia ruchu

transgranicznego, wzrostu kosztów transportu publicznego, obsługi urzędów, a przede wszystkim ochrony zdrowia. Opóźnione diagnozy chorób, odłożone wizyty i zabiegi lekarskie będą rzutować przez następne lata na zdrowotność społeczeństwa. Zakładając rychły koniec pandemii COVID-19, ponieważ historyczne pandemie trwały zazwyczaj 2-3 lata, pojawia się pytanie, czy można było jej zapobiec. W poszukiwaniu przyczyn pandemii w skali globalnej, warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła o stanie zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym już 30 stycznia 2020 r. COVID-19 nazwano pandemią 11 marca 2020 r. Tradycyjne i znane od setek lat procedury izolacji chorych oraz osób z kontaktu zakażonych okazały się mało skuteczne. Poza wspomnianym zmiennym stopniem nasilenia choroby i jej zakaźnością, prawdopodobnie nie spełniły oczekiwań z powodu ich częstego naruszania. Program szczepień ograniczył liczbę osób wymagających hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19 i był w praktyce dostępny od stycznia 2021 r. Pozostaje zatem mieć nadzieję na szybkie naturalne wygaśnięcie obecnej pandemii. SARS-CoV-2 zapewne dołączy do kilku innych sezonowo zakażających koronawirusów. Pozostaną jednak obawy, czy w przyszłości kolejny wirus, pokonując barierę międzygatunkową, nie poczyni podobnego spustoszenia wśród ludzi. Przecież podatność człowieka na zakażenia wirusowe, chęć podróżowania, kontestacja narzucanych ograniczeń sanitarnych i bezkrytyczna wiara we własne zdrowie jest zapisana w naszych genach.

Streszczenie

Błyskawiczne rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ma swoją przyczynę nie tylko w biologii tego łatwo przekazującego się zakażenia, lecz również w zwiększeniu mobilności globalnej populacji oraz szybkości transportu międzynarodowego. Z perspektywy historycznej, pandemie wirusowe występowały już w czasach nowożytnych, były spowodowane przeskokiem na człowieka wirusa z rezerwuaru zwierzęcego i również objęły setki milionów mieszkańców ziemi. Dzięki osiągnięciom diagnostyki molekularnej i nowym metodom sekwencjonowania jesteśmy świadkami bieżącej oceny stanu epidemicznego indywidualnych populacji oraz szybkiej ewolucji wirusa. Wpływ tych osiągnięć medycyny na sam przebieg pandemii pozostał umiarkowany. Największe sukcesy w jej opanowaniu odniosły izolowane geograficznie Australia i Nowa Zelandia, które po prostu zamknęły granice zewnętrzne i wprowadziły wielomiesięczne restrykcje dla obywateli. Zostały opracowane szczepionki przeciwko COVID-19, które przetestowano i zatwierdzono do zastosowania. Ich działanie ochronne przed ciężkim zachorowaniem nie budzi wątpliwości. Jednak następna fala zakażeń COVID-19 ogarnia kolejne kraje, zmienia się jedynie struktura demograficzna chorych, którym młodszy wiek i dobre samopoczucie dawało ułudę wrodzonej odporności.

LITERATURA

- ANSEMS K., GRUNDEIS F., DAHMS K., MIKOLAJEWSKA A., THIEME V., PIECHOTTA V. i współaut., 2021. *Remdesivir for the treatment of COVID-19*. Cochrane Database Syst. Rev. 8, doi: 10.1002/14651858.CD014962.
- FORD N., VITORIA M., RANGARAJ A., NORRIS S.L., CALMY A., DOHERTY M., 2020. *Systemic review of the efficacy and safety of antiretroviral drugs against SARS, MERS or COVID-19: initial assessment*. J. Int. AIDS Soc. 23, doi: 10.1002/jia2.25489.
- GANESH B., RAJAKUMAR T., MALATHU M., MANIKANDAN N., NAGARAJ J., SANTHAKUMAR A. i współaut., 2021. *Epidemiology and pathobiology of SARS-CoV-2 (COVID-19) in comparison with SARS, MERS: An updated overview of current knowledge and future perspectives*. Clin. Epidemiol. Global Health 10, doi: org/10.1016/j.cegh.2020.100694.
- HO F. K., MAN K. K. C., CHURCH C., CELIS-MORALES C., WONG I. C. K., BERRY C., i współaut., 2021. *Thromboembolic risk in hospitalized and nonhospitalized COVID-19 patients: a self-controlled case series analysis of a nationwide cohort*. Mayo Clin. Proc. 96, 2587-2597.
- HUSSAIN A., RASOOL S. T., POTTAHIL S., 2021. *The evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 during pandemic and adaptation to the host*. J. Mol. Evol., doi: 10.1007/s00239-021-10008-2.
- KORATH A. D. J., JANDA J., UNTERSMAIR E., SOKOŁOWSKA M., FELESZKO W., AGACHE I., SEIDA A. A. i współaut., 2021. *One health: EAACI position paper on coronaviruses at the human-animal interface, with a specific focus on comparative and zoonotic aspects of SARS-CoV-2*. Allergy doi: 10.1111/all.14991.
- LOPEZ M. G., CHINER-OMS A., DE VIEDMA D. G., RUIZ-RODRIGUEZ P., BRANCHO M. A., CANCINO-MUNOZ I. i współaut., 2021. *The first wave of the COVID-19 epidemic in Spain was associated with early introductions and fast spread of a domination genetic variant*. Nat. Genet. 53, 1405-1414.
- PAIRO-CASTINEIRA E., CLOHISEY S., KLARIC L., BRETHERIC A. D., RAWLIK K., PASKO D. i współaut., 2021. *Genetic mechanisms of critical illness in COVID-19*. Nature 591, 92-98.
- SCHIJVEN J., VERMEULEN L. C., SWART A., MEIJER A., DUISER E., DE RODA HUSMAN A. M., 2021. *Quantitative microbial risk assessment for airborne transmission of SARS-CoV-2 via breathing, speaking, singing, coughing, and sneezing*. Environ. Health Perspect. 129, doi: 10.1289/EHP7886.
- SHRESTA L. B., TEDLA N., BULL R. A., 2021. *Broadly-neutralizing antibodies against emerging SARS-CoV-2 variants*. Front. Immunol. 12, doi: 10.3389/fimmu.2021.752003.
- VIJGEN L., KEAERTS E., MOES E., THOELLEN I., WOLLANTS E., LEMEY P., VANDAMME A.-M., VAN RANTS M., 2005. *Complete genomic sequence of human coronavirus OC43: molecular clock analysis suggests a relatively recent zoonotic transmission event*. J. Virol. 79, 1595-1604.

KOSMOS Vol. 70, 3, 389–397, 2021

MAREK SANAK

Division of Molecular Biology and Clinical Genetics, Department of Internal Medicine, Jagiellonian University Collegium Medicum, 8 Skawińska Str., 31-066 Kraków, E-mail: marek.sanak@uj.edu.pl

GENETICS OF COVID-19 PANDEMICS

Summary

The rapid spread of SARS-CoV-2 infection is due not only to the biology of this easily transmissible virus, but also to the increased mobility of the global population and the speed of international transport. From a historical perspective, viral pandemics have already occurred in modern times, were caused by the virus switching to humans from an animal reservoir and also affected hundreds of millions of inhabitants of the earth. Thanks to the advancements of molecular diagnostics and new sequencing methods, we are witnessing an ongoing assessment of the epidemic state of individual populations, and the rapid evolution of the virus. The impact of these medical achievements on the course of the pandemic itself has remained moderate. The most successful in control of pandemics were geographically isolated Australia and New Zealand, which simply closed their external borders and introduced months of restrictions for citizens. Vaccines against COVID-19 have been developed that following rapid clinical tests were approved for use. Their protective effect against severe illness is beyond doubt. However, the next wave of COVID-19 infections is sweeping more countries, only that the demographic structure of patients is changing, whose younger age and well-being gave a delusion of innate immunity.

Keywords: coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 pandemics, genetic susceptibility to infection, genetic variants of the virus